Repatha® (ewolokumab) jest dostępna za darmo dla pacjentów zakwalifikowanych do programu lekowego B.101 – leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi.

Dla pacjentów otrzymujących lek Repatha poza programem lekowym, **szacowany miesięczny koszt terapii przy pełnej odpłatności (100%) wynosi około 1500 zł.****

** Cena sprzedaży do apteki wynosi 724,99 zł brutto za jeden wstrzykiwacz zawierający 140 mg substancji czynnej.
Lek Repatha® 140 mg podaje się raz na dwa tygodnie, co oznacza, że miesięczna terapia wymaga dwóch wstrzykiwaczy.
Szacowany miesięczny koszt terapii wynosi zatem około 1449,98 zł brutto. Do tej kwoty należy doliczyć marżę apteczną, która może się różnić w zależności od placówki, co oznacza, że ostateczna cena dla pacjenta może być wyższa.

Choroby układu sercowo-naczyniowego pozostają najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce.[1]

Zaledwie 17% pacjentów osiąga cel terapeutyczny dla pacjentów **z grupy bardzo dużego ryzyka** (< 55 mg/dl).

U pacjentów **z grupy ekstremalnego ryzyka** sytuacja jest jeszcze gorsza:

mniej niż 10% z nich osiąga założony cel terapeutyczny (< 40 mg/dl).[2]



Referencje:
1. Mitkowski P. Medonet. 2024;19 września. Choroby sercowo-naczyniowe wciąż główną przyczyną zgonów w Polsce. „Dwukrotnie większe ryzyko". Dostępne na: https://www.medonet.pl/zdrowie/wiadomosci,choroby-sercowo-naczyniowe-wciaz-glowna-przyczyna-zgonow-w-polsce--dwukrotnie-wieksze-ryzyko,artykul,04661262.html
2. Banach M, Burchardt P, Chlebus K, et al. Wytyczne PTL/KLRWP/PTK/PTDL/PTD/PTNT diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce 2021. Polskie Towarzystwo Lipidologiczne; 2021.
3. Kasichayanula S, Grover A, Emery MG, et al. Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of evolocumab, a PCSK9 inhibitor. Clin Pharmacokinet. 2018;57(7):769-779.
4. Leucker TM, Blaha MJ, Jones SR, et al. Effect of evolocumab on atherogenic lipoproteins during the peri- and early postinfarction period: a placebo-controlled, randomized trial. Circulation. 2020;142(4):419-421.
5. Sabatine MS, Giugliano RP, Keech AC, et al. Evolocumab and clinical outcomes in patients with cardiovascular disease. N Engl J Med. 2017;376(18):1713-1722.
6. Mach F, Koskinas KC, Roeters van Lennep JE, Tokgözoğlu L, Badimon L, Baigent C, et al. 2025 Focused Update of the 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J. 2025;00:1-20. doi:10.1093/eurheartj/ehaf190
7. Nicholls SJ, et al. JACC Cardiovasc Imaging. 2022;15(7):1308-1321.
8. Nicholls SJ, Puri R, Anderson T, Ballantyne CM i wsp. Effect of Evolocumab on Progression of Coronary Disease in Statin-Treated Patients: The GLAGOV Randomized Clinical Trial. JAMA 2016; 316(22): 2373-2384.
9. 2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI Guideline for the Management of Patients With Acute Coronary Syndromes. American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. 2025.
10. O'Donoghue ML et al. Long-term evolocumab in patients with established atherosclerotic cardiovascular disease. Circulation 2022; 146(15): 1109–1119.
11. Gaba P et al. Association between achieved low-density lipoprotein cholesterol levels and long-term cardiovascular and safety outcomes: an analysis of FOURIER-OLE. Circulation 2023; 147(16): 1192-1203.
12. Repatha (ewolokumab) - Charakterystyka Produktu Leczniczego, marzec 2023.

Repatha® to inhibitor PCSK9, który w sposób szybki, intensywny i trwały **obniża poziom cholesterolu LDL** – kluczowego czynnika ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.[3-5]

Repatha® (ewolokumab)

Przed przepisaniem należy zapoznać się z pełną informacją o produkcie Repatha® (ewolokumab):

Dlaczego Repatha®?

Udowodniona skuteczność kliniczna

Redukcja stężenia LDL-C o ok. 60% w ciągu 1–2 tygodni[3-5]. Inhibitor PCSK9 w terapii skojarzonej ze statynami i ezetymibem redukuje stężenie LDL-C nawet o 80%[6]

Zmniejszenie ryzyka incydentów CV (śmierć CV, zawał, udar) o 20%[5]

Potwierdzona stabilizacja blaszki miażdżycowej[7]

Regresja blaszki miażdżycowej u 64,3% pacjentów leczonych Repathą®[8]

Zaufanie i rekomendacje

Rekomendowana dla pacjentów ekstremalnego lub bardzo dużego ryzyka sercowo-naczyniowego w wytycznych PTL/KLRWP/PTK/PTDL/PTD/PTNT[2], ESC/EAS[6] i AHA/ACC[9] i innych.

Bezpieczeństwo i tolerancja

Ponad 8 lat obserwacji klinicznej potwierdza korzystny profil bezpieczeństwa - porównywalny z placebo, nawet przy redukcji LDL-C poniżej 20 mg/dl[10,11]

Prosty schemat dawkowania

140 mg co 2 tygodnie[12]

Sposób podania

Lek Repatha® (ewolokumab) w urządzeniu SureClick podaje się w formie podskórnego wstrzyknięcia za pomocą wstrzykiwacza półautomatycznego[12]

Dla kogo?

Wskazania rejestracyjne do stosowanie leku Repatha®[12]:

Rozpoznana miażdżycowa choroba układu sercowo -naczyniowego*

Hipercholesterolemia i dyslipidemia mieszana#

Postać homozygotyczna rodzinnej hipercholesterolemii^

Czy wszyscy Twoi pacjenci z bardzo dużym lub ekstremalnym ryzykiem sercowo-naczyniowym otrzymują leczenie pozwalające osiągać cele terapeutyczne, zgodne z wytycznymi PTL/KLRWP/PTK/PTDL/PTD/PTNT diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce 2021[2]?



Intensywność leczenia hipolipemizującego[6]

Leczenie	Średnia redukcja LDL-C
Statyna w pośredniej dawce	≈30%
Statyna w wysokiej dawce	≈50%
Statyna w wysokiej dawce plus ezetimib	≈60%
Inhibitor PCSK9	≈60%
Inhibitor PCSK9 plus statyna w wysokiej dawce	≈75%
Inhibitor PCSK9 plus statyna w wysokiej dawce plus ezetimib	≈80%

* Produkt leczniczy Repatha jest wskazany do stosowania u osób dorosłych z rozpoznaną miażdżycową chorobą układu sercowo-naczyniowego (zawał mięśnia sercowego, udar mózgu lub choroba tętnic obwodowych) w celu zmniejszenia ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego poprzez zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL, jako uzupełnienie skorygowania innych czynników ryzyka:
• w skojarzeniu z maksymalną tolerowaną dawką statyny lub bez innych terapii zmniejszających stężenie lipidów lub,
• samodzielnie lub w połączeniu z innymi terapiami zmniejszającymi stężenie lipidów u pacjentów z nietolerancją statyn, lub u których stosowanie statyn jest przeciwwskazane.

POL-145-25-80023, data utworzenia: wrzesień 2025 r.

\# Produkt leczniczy Repatha jest wskazany do stosowania u dorosłych z pierwotną hipercholesterolemią (rodzinną heterozygotyczną i nierodzinną) lub mieszaną dyslipidemią oraz u dzieci i młodzieży w wieku co najmniej 10 lat z heterozygotyczną postacią rodzinnej hipercholesterolemii, jako uzupełnienie diety: • w skojarzeniu ze statyną lub statyną i innymi lekami hipolipemizującymi u pacjentów, u których nie jest możliwe osiągnięcie docelowego stężenia cholesterolu LDL przy zastosowaniu statyny w najwyższej tolerowanej dawce, albo • w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami hipolipemizującymi u pacjentów nietolerujących statyn, albo u których stosowanie statyn jest przeciwwskazane.

\^ Produkt leczniczy Repatha jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z innymi lekami hipolipemizującymi u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku co najmniej 10 lat z homozygotyczną postacią hipercholesterolemii rodzinnej.